



Chenille des boutons floraux - Shoot borer

(*Scrobipalpa ergasima*)



Aubergine - Eggplant



C'est une chenille solitaire translucide dotée d'une tête noire et s'attaquant aux boutons floraux des plantes, principalement au cours des saisons sèches. En fin de stade larvaire, la chenille prend une couleur rougeâtre et chute au sol où elle se nymphose. On peut voir un trou dans les boutons floraux correspondant à la sortie de la chenille.

Lonely translucent black head caterpillar which attacks buds, mostly during dry seasons. At the end of larval stage, the caterpillar becomes red and falls on the soil where it will become a nymph. Holes due to caterpillar exit can be seen on bud.

Symptômes et dégâts - Symptoms and damage



Le plus souvent les chenilles attaquent les bourgeons floraux, entraînant l'avortement des fleurs. Dans certains cas, elles attaquent aussi les jeunes fruits, en dévorant l'intérieur et empêchant alors le développement total du fruit.

Caterpillars eat the inside part of buds, inducing abortion. Sometimes, they also attack young fruits, eating the inside part, and stopping total development of the fruit.

Prévention des dégâts - Damage prevention

- Bien observer les boutons floraux avant floraison. *Regularly check buds before flowering.*
- Appliquer un insecticide (*Bacillus thuringiensis*). *Apply an insecticide (Bacillus thuringiensis).*