



Cicadelle ou Jasside - Leafhopper or Jassid



Aubergine - Eggplant : *Jacobiasca* spp.
Gombo - Okra : *Amrasca biguttula biguttula*



C'est un petit insecte vert très vif au stade larvaire qui saute, pique et suce le contenu des feuilles sur la face inférieure. Les dégâts sont causés par l'insecte aussi bien au stade jeune qu'au stade adulte. La plante est plus sensible au stade jeune.

It is a very vivacious little green insect which jumps and sucks the sap by biting the under side of leaves. Insect can attack both at larval and mature stage. Young plants are more sensitive.



Symptômes et dégâts - Symptoms and damage



Les bordures des feuilles jaunissent et s'incurvent vers le haut. La coloration des bords devient brun-rouge et s'étend ensuite aux tissus situés entre les nervures.

Leaves edges turn yellow and bend up. Borders coloration becomes red-brown and stretches to the intervein tissues.

Les feuilles se dessèchent et peuvent chuter, ce qui entraîne des pertes de rendement ou la mort de la plante.

Leaves dry and can fall down. It can lead to yield losses or plant death.



Prévention des dégâts - Damage prevention

- Observer les plantes en début de culture pour identifier l'apparition des premières cicadelles ou des premiers symptômes.

Observe plants at crop beginning to identify first leafhoppers or symptoms appearance.

- Appliquer un traitement insecticide dès l'apparition des premiers dégâts, surtout au stade plantule. Intervenir après fructification n'est pas nécessaire.

Apply insecticide when first damage appear, particularly at seedling stage. No intervention necessary after fruiting.

- Eviter de cultiver près d'autres malvacées (bissap, cotonnier) ou solanacées (tomate, poivron, aubergine).

Avoid to grow near Malvaceae (bissap, cotton plant) or Solanaceae (tomato, pepper, eggplant, ...).

- Reportez-vous aux pages sur les pucerons et les mouches blanches .

Refer to pages about aphids and whiteflies .