



Noctuelle de la tomate - Tomato fruit worm

(*Helicoverpa armigera*)



Tomate - Tomato



C'est un papillon qui, au stade chenille, mange l'intérieur des fruits, les feuilles et les fleurs. Cela provoque également l'apparition de pourritures qui rendent le fruit inconsommable.

It is a caterpillar which eats inside part of fruits, leaves and flowers. It induces rot and fruits become inedible.



Symptômes et dégâts - Symptoms and damage



Un gros trou sur le fruit est caractéristique d'une attaque. Il suffit d'ouvrir le fruit pour observer la chenille à l'intérieur.

Big hole on fruits is probably due to an attack. Just open the fruit to observe caterpillar inside.



Prévention des dégâts - Damage prevention

- Utiliser des pièges à phéromones pour surveiller les premières apparitions de la noctuelle. *Use insects pheromon traps to monitor first insects apparitions.*
- Éliminer les fruits attaqués et appliquer un insecticide spécifique à base de *Bacillus thuringiensis* ou extraits de plantes à partir de la nouaison. *Remove attacked fruits and apply specific insecticides at the beginning of fruit setting stage.*
- Réaliser un labour superficiel après la dernière récolte. *Realize a shallow ploughing after last harvest.*

Confusions possibles - Possible confusions

- Mouche des fruits - *Fruit fly*

